




แนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด

1. กลุ่มปลอดสารเสพติด ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน

2. กลุ่มเสี่ยง มีประสบการณ์ ใช้ยาแต่เลิกแล้ว มี-ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน

3. กลุ่มติดสารเสพติด ยังใช้ยาและเสพติด พฤติกรรมเบี่ยงเบน เห็นได้ชัด

4. กลุ่มนำสงสัย เป็นผู้จำหน่าย - เป็นผู้ติดยามาก่อน - ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย - ร่ำรวยผิดปกติ

- จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน
 - กิจกรรมแนะแนว
 - กิจกรรมโฮมรูม
- จัดกิจกรรมเรียนรู้เชิงบูรณาการ
- จัดกิจกรรมทางเลือกหลากหลาย
 - กิจกรรมชุมนุม/ชมรม
 - กิจกรรมค่าย
- ใช้กระบวนการกลุ่มเน้นทักษะการปฏิบัติ
- รณรงค์/ปลูกจิตสำนึก
 - คำขวัญ-บทความ
 - ทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน
 - สื่อสารมวลชน
- สร้างปัจจัยบวก ลดปัจจัยลบ
- จัดบรรยากาศอบอุ่นปลอดภัย
- จัดระบบดูแลเฝ้าระวัง



Just Say No

เฝ้าระวัง-ใกล้ชิด

- แนวทางเดียวกับกลุ่ม 1
- จัดบรรยากาศให้ห่างสิ่งกระตุ้น
- ให้พี่เลี้ยงดูแล
- ปฏิรูปการจัดประสบการณ์เรียนรู้
- ตรวจสอบภาพ ตรวจปัสสาวะ
- แนะแนวและให้คำปรึกษา
- ปรับพฤติกรรม



ฟื้นฟู เยียวยา ให้กำลังใจ

- แนวทางเดียวกับกลุ่ม 1 และ 2
- สอดส่องดูแลเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
- ตรวจสุขภาพ
- บำบัดรักษา เช่น กลุ่มจิตสังคมบำบัด อาชีวบำบัด
- ฟื้นฟู เช่น กิจกรรมทางเลือกหลากหลาย กระบวนการกลุ่ม ปรับพฤติกรรม กิจกรรมค่ายเฉพาะการฟื้นฟู
- ให้กำลังใจเสริมแรงทางบวก
- พักการเรียนในกรณีที่นักเรียนไม่พร้อมจะเรียน
- ประสานงานผู้ปกครองและหน่วยงานสาธารณสุข



เฝ้าระวัง-ติดตาม

- | | |
|---|---|
| ท | <ul style="list-style-type: none"> แนวทางเดียวกับกลุ่ม 1, 2 และ 3 |
| อ | <ul style="list-style-type: none"> เฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิด |
| อ | <ul style="list-style-type: none"> ตัดเตือน/ทัณฑ์บน แจ้งผู้ปกครองให้จับตามดูแล |
| น | <ul style="list-style-type: none"> สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง เช่น คำความดี ใช้มาตรการทางสังคม |
| น | <ul style="list-style-type: none"> ใช้มาตรการทางกฎหมาย แจ้งตำรวจ ปปส. |

กระบวนการคัดกรอง ปัญหายาเสพติด

นักเรียน

เกณฑ์ทั่วไป

1. การเรียนแย่ลง
2. ต่อต้านระเบียบ
3. หุนหันพลันแล่น
4. ทะเลาะวิวาท
5. ไม่ค่อยมีเพื่อน

เกณฑ์กลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาโดยเฉพาะ

1. ขว้างเหวี่ยง หลับในห้องเรียน
2. ชี้ม กระสับกระส่าย หงุดหงิด
3. แยกตัว ไม่ร่วมกิจกรรม ขาดเรียน
4. ไม่สนใจสุขภาพ/ความสะอาด
5. ต้องการใช้เงินเพิ่มมากขึ้น
6. คบเพื่อนในกลุ่มใช้ยา-ค้ายา
7. สมาชิกในครอบครัวใช้ยา/ค้ายา



ไม่มีข้อใดข้อหนึ่ง

+กลุ่มปลอดภัย



เข้าข้อใดข้อหนึ่ง

สัมภาษณ์

รับ

ปฏิเสธ

บำบัด

ตรวจสอบ
ปีสภาวะ

ผลลบ

ดูแลใกล้ชิด

ผลบวก

เกณฑ์กลุ่มมีปัญหาใช้ยา

1. มีอาการทางร่างกาย ขว้างซีม เบื่ออาหาร
2. มีอาการติดยา ต้องใช้ยามากขึ้น
3. ต้องการใช้ยา ควบคุมตัวเองไม่ได้
4. หมกมุ่นกับการใช้ยา
5. ไม่สนใจเรียน/สังคม/ไม่ดูแลตัวเอง

เข้าข้อใดข้อหนึ่งในข้อ 1 และ 5

เข้าเกณฑ์เกิน 2 ใน 5 ข้อ

กลุ่มเสี่ยง

ส่งบำบัด

กลุ่มติด